

Симптомы и лечение норовирусной инфекции

Норовирус («вирус Норвич», англ. Norwalk virus) – вирус, который вызывает острые кишечные инфекции

Основные симптомы заболевания:



Однократная, но чаще многократная рвота



Диарея



Тошнота



Повышение температуры



Головная боль



Боль в мышцах



Слабость

Основные пути передачи:



пищевой

Употребление в пищу немытых фруктов, овощей, салата или зелени.



водный

Прием жидкости, содержащей вирус



контактно-бытовой

Попадание вируса через немытые руки, предметы общего пользования, посуду и т.д.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД:



часов после заражения

Основные методы лечения:

При первых симптомах незамедлительно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением



- Обильное питье (зеленый чай, настой ромашки, минеральная вода без газа)

Помните – рвота и диарея приводят к быстрому обезвоживанию организма и особенно опасна для детей дошкольного возраста

ПОМНИТЕ!



Объем выпитой жидкости в первые 6–8 ч болезни – 80–50 мл на 1 кг массы тела



Ребенку необходимо давать жидкость по чайной ложке с интервалом примерно в 15 минут

В случае непрекращающейся рвоты и ухудшения состояния нужно срочно звонить в скорую и ехать в больницу

Профилактика норовирусной инфекции



Мыть руки перед едой, после прогулки, после туалета



Не употреблять пищу, купленную с рук, сомнительного происхождения



Обработка овощей и фруктов, употребление в пищу термически обработанных продуктов



Употреблять безопасной воды и напитков (купленная вода, напитки в фабричной упаковке)



При купании в водомаяках и бассейнах не допускать попадания воды в рот

При контакте с больным:

- Носить перчатки при уходе за больным

- Щадительно мыть руки мылом и водой

- Кипятить посуду и предметы, которыми пользовался инфицированный больной

- Стирать вещи больного при температуре не менее 60°C

- Проводить уборку хлорсодержащими дезинфицирующими средствами

- Одн раз в день проводить обработку всех поверхностей, с которыми контактировал зараженный человек (кровать, санузлы, ручки дверей и т.д.)

На основе рекомендаций специалистов Роспотребнадзора